



МАЛЯРИЯ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ.

Исследование выполнено за счет
гранта Российского научного фонда №
22-28-20115, «Советское государство
и общество в процессе осмысления и
решения экологических проблем Севера
Западной Сибири в 1917–1991 гг.»

Барабанова Ксения Сергеевна, к.и.н.
СурГПУ, лаборатория исторических исследований, в.н.с.
ТюмГУ, лаборатория междисциплинарных исследований пространства, ст.н.с.
barabanova13@gmail.com





- В 1902 году Общество русских врачей памяти Н.И. Пирогова организовало Постоянную комиссию по изучению малярии, благодаря чему в Российской империи начали сбор статистических сведений о заболевании.
- К началу 1920-х гг. малярия приняла характер пандемии. Уровень заболеваемости вырос в два раза.
- В 1921 году Народный комиссариат здравоохранения начал планомерную борьбу с малярией.
- В течение нескольких лет по всей стране открылось 100 малярийных станций, первая из которых начала свою работу в Саратове 22 сентября 1922 года под руководством Н.Е. Кушева.
- Как отмечал М.А. Семенов к началу Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в тех частях Западной Сибири, где проблема малярии была актуальна еще со времен Российской империи, наблюдалась тенденция к возможной ликвидации заболевания.
- Во время войны произошел откат назад и ликвидации массового характера малярии удалось добиться только в 1952 году, а в 1960 году было заявлено прекращении этого заболевания в СССР.

Малярия – это инфекционное заболевание, которое вызывается поступлением в организм человека одноклеточных организмов из рода Плазмодиев (Plasmodium) при укусе зараженным комаром.

Выделяют несколько вариантов заболевания:

- тропическую малярию,
- трехдневную,
- четырехдневную.

Наибольшее распространение в СССР получила трехдневная малярия. Основными симптомами малярии являются повторяющиеся приступы озноба, повышение температуры, потливость, поражение печени и селезенки. При отсутствии лечения возможен летальный исход.



МАЛЯРИЯ – ТЯЖЕЛАЯ ЗАРАЗНАЯ БОЛЕЗНЬ

Малярия передается здоровому человеку малярийным комаром, который за 10–20 дней до этого носился кровью у человека, больного малярией. Малярия обычно протекает в виде отдельных приступов, которые продолжаются несколько часов и повторяются через день, два или ежедневно.



Т	1	2	3	4	5	6	7	8...
	У.В.	Д.В.	У.В.	Д.В.	У.В.	Д.В.	У.В.	Д.В.

ТЕМПЕРАТУРА У БОЛЬНОГО МАЛЯРИЕЙ

Приступ малярии начинается сильным ознобом, который сменяется жаром. У больного поднимается температура до 40°, ломит все тело, болит голова. Затем температура падает, и приступ кончается.

Серию рис. см. в журнале "Дети и малярия". Автор рисунка: И. Г. Сурганов. Купцова И. П., Волынецкая Г. А., М. Пестельский. ©1980. Тираж 10 000 экз. Цена 20 коп.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

© Издательство "Медицина". Москва, 1980.



Ханты–Мансийский национальный округ:

- Зима – морозы
- Лето – комары.
- Территория относится к зонам избыточного и весьма избыточного увлажнения при недостаточной теплообеспеченности.
- Средняя температура воздуха согласно многолетним наблюдениям в разных частях округа варьируется от $1,1^{\circ}$ до $3,8^{\circ}$.





Главным богатством региона являлись водные ресурсы. По территории округа протекают крупнейшие реки Западной Сибири – Обь и Иртыш, чьи притоки также соизмеримы с крупными водными артериями.



Остяко – Возульск.рф

Для Ханты-Мансийского национального округа в 1940-е гг. главной угрозой здоровью населения были желудочно-кишечные заболевания, среди которых лидировал тиф и дизентерия.

- Во-первых, в округе были неразрешенные проблемы с загрязнением территории.
- Во-вторых, население округа было почти полностью заражено описторхозом.



Остяко-Вогульск.рф



Остяко-Вогульск.рф

- В 1943 году сотрудники малярийной станции в Ханты-Мансийском национальном округе зафиксировали резкий рост числа больных малярией.
- Пик заболеваемости пришелся на 1945 год – 5311 больных. Такой всплеск заболеваемости произошел на фоне отсутствия препаратов для



Год	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947
Больные	279	228	168	1183	3000	5311	4590	3880

В 1946 году
была налажена
поставка
противомалярий
ных
препаратов.

Наиболее
поражены
малярией:

- Самаровский
(2 169
случаев),
- Кондинский
(646 случаев),
- Микояновский
- Сургутский



Остяко-Вогульск.рф



Остяко-Вогульск.рф

- В качестве основной меры по ликвидации эпидемии в 1946 году были выбраны меры по борьбе с выкладкой яиц комаров.
- Следовало благоустроить и привести в «санитарно-культурное» состояние территории населенных пунктов, рыбзаводов и других производств.



- В 1945 году в Ханты-Мансийске по малярии было выдано 185 больничных листов нетрудоспособности, что в пересчете означало 1384 дня нетрудоспособности.
- В 1947 году эпидемиологическая обстановка оставалась угрожающей, но врачи отмечали сокращение больных

ЛЕЧИТЕ МАЛЯРИЮ



1. Кровь здорового человека.
2. Кровь человека, больного малярией.



ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ У БОЛЬНОГО МАЛЯРИЕЙ.

Обращайтесь к врачу в начале болезни. Точно выполняйте все его назначения и указания. Правильное лечение обеспечивает скорейшее и полное выздоровление от малярии.





ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАЛЯРИИ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ксения Сергеевна Барабанова
barabanova13@gmail.com